

GAZETA LEKARSKA

PISMO TYGODNIOWE

POŚWIĘCONE

WSZYSTKIM GAŁĘZIOM UMIEJĘTNOŚCI LEKARSKIEJ,
FARMACYI I WETERYNARYI.

W Warszawie: rocznie . . . Rs. 5 kop. —
" półrocznie " 2 " 50
" kwartalnie " 1 " 25

Na Stacjach pocztowych w Królestwie:
" " rocznie . . . Rs. 6.
" " półrocznie " 3.

W Cesarstwie wraz z przesyłką pocztową: rocznie Rs. 8.

TRESC: Mięsak śluzowy szczęki; nader liczne nerwiaki wrzekome etc. Prof. Brodowski. — Zupa Liebig'a dla dzieci, jej przyrządzenie i skuteczność. Prof. Fudakowski. — Kronika zagraniczna Choroba Addison'a (dokończenie). F. Czajewicz. — Leczenie ran postrzałowych do stawu kolanowego przenikających Dr. Stankiewicz. — Krytyka Prof. Brodowski. — Część statystyczna. — Od Redakcyi.

Mięsak śluzowy szczęki (*myxo-sarcoma maxillae superioris*). Nader liczne nerwiaki wrzekome. (*neuromata multiplicia spuria*). Wycięczenie ogólne w wysokim stopniu. Śmierć w skutek niezbyt wielkiego krwotoku po operacyi.

Opisał Prof. Brodowski.

Jan L....., wyrobnik 27 lat wieku, dosyć dobrze zbudowany, lecz mocno wycieńczony, blady, osłabiony przybył z okolic Łowicza 19go lipca 1865 r. do szpitala Dzieciątka Jezus, w celu pozbycia się olbrzymiego guza, którego siedliskiem była prawa szczęka chorego. Przyczém chory oznajmił, iż choroba jego datuje od 10 miesięcy, że początkiem jej było zjawienie się małego guzika na prawym policzku pod skórą, dającego się nieco poruszać i niebolesnego, który bardzo szybko wzrastał, szczególnie ostatnimi czasy. Co się zaś tyczy nadmienionego wyżej osłabienia ogólnego, to chory utrzymywał, że zaczął je dostrzegać dopiero przed 4ma miesiącami. Kol. Orłowski który nam tych szczegółów łaskawie udzielił, a w oddziale którego L..... był umieszczony, nie więcej nie mógł się dowiedzieć o przeszłości swego pacjenta.

Stan obecny chorego był rozpaczliwy: twarz mocno oszpecona z powodu bardzo znacznego wygórowania prawego policzka, który się przedstawiał w postaci stożkowatego, dosyć twardego guza, równającego się niemal głowie noworodka. Podstawa tego olbrzymiego guza nieznacznie zlewała się z częściami otaczającymi; górna część prawej połowy nosa całkowicie w nim zniknęła, powieki oka prawego przymknięte i dosyć mocno pociągnięte na zewnątrz, gałka oczna obrócona ku górze i także na zewnątrz nieco zsunięta. Chory tém okiem ledwo dzień od nocy odróżnia. Prawy kąt otworu ust i prawe skrzydło nosa pociągnięte ku dołowi. Skóra na guzie mocno napięta, w ogóle blada, na najwynioślejszej zaś jego części nieruchoma, zcieńczała, zaczerwieniona. W tém miejscu znajduje się